

Delta Quiet

MANUALE PRATICO



DOSAGGIO CONSIGLIATO:

10 g x q.le peso vivo una o due volte al giorno

Il prodotto può essere usato previa diluizione con acqua direttamente sulla mangiatoia o nel carro miscelatore. Può essere usato anche nell'acqua di abbeveraggio nelle stalle predisposte.

CASI PRATICI DI UTILIZZO (DEL DELTA QUIET:)

- 1) All'arrivo dei ristalli
- 2) Prima della vaccinazione o altro trattamento veterinario di massa
- 3) Per lo spostamento programmato di box degli animali
- 4) Ultimo cambio di lettiera prima della macellazione
- 5) Trattamento per il trasporto al macello
- 6) Casi di nervosismo di massa durante il ciclo per cause non ben identificabili
- 7) Per prevenire la tendenza alla “carne scura“ nell'ultima settimana.

1 - ARRIVO DEI RISTALLI -

Nei primi giorni il branco deve ricostruire la gerarchia. Gli animali lottano e si montano; il nervosismo di questi primi giorni comporta un innalzamento del tasso di cortisolo endogeno, l'animale quindi potrebbe subire un deficit immunitario diventando più sensibile alle malattie.

In questa situazione si consiglia di trattare gli animali nel seguente modo:

1^ giornata: 10 g/q.le peso vivo due volte a distanza di 8/12 ore

2^ giornata: 10 g/q.le peso vivo una sola volta

Miscelare accuratamente il prodotto, previa diluizione in acqua, con l'alimento direttamente sulla mangiatoia.

2 - PRIMA DELLA VACCINAZIONE O ALTRO TRATTAMENTO VETERINARIO DI MASSA -

In questa situazione si consiglia di trattare gli animali nel seguente modo:

Iniziare il trattamento il giorno precedente, con un dosaggio di 10 g/q.le peso vivo per due volte al giorno a distanza di 8/12 ore direttamente sulla mangiatoia, se si usa il carro miscelatore usare l'intero dosaggio della giornata 20 g/q.le peso vivo in una sola volta.

In entrambi i casi prediluire il prodotto con acqua.

3 - PRIMA DI UN CAMBIO PROGRAMMATO DI BOX -

**In questa situazione si consiglia di trattare gli animali
nel seguente modo:**

Iniziare il trattamento il giorno precedente lo spostamento previsto con un dosaggio di 10 g/q.le peso vivo per due volte al giorno direttamente sulla mangiatoia se si usa il carro miscelatore utilizzare l'intero dosaggio della giornata 20 g/q.le peso vivo, in una sola volta. Continuare il giorno dello spostamento di box con un dosaggio di 10 g/q.le una volta al giorno con il primo pasto.

In entrambi i casi prediluire il prodotto con acqua.

4 - ULTIMO CAMBIO DI LETTIERA -

In questa situazione si consiglia di trattare gli animali nel seguente modo:

Iniziare il trattamento il giorno precedente il cambio di lettiera, con un dosaggio di 10 g/q.le peso vivo per due volte al giorno direttamente nella mangiatoia, se si usa il carro miscelatore utilizzare l'intero dosaggio della giornata, 20 g/q.le peso vivo, in una sola volta. Continuare il giorno del cambio di lettiera con un dosaggio di 10 g/q.le peso vivo una volta al giorno con il primo pasto.

In ogni caso prediluire il prodotto con acqua.

5 - TRATTAMENTO PER IL TRASPORTO -

In questa situazione si consiglia di trattare gli animali nel seguente modo:

Si utilizza in previsione del trasporto al macello.

Inizio del trattamento 1 o 2 giorni prima della partenza programmata. Fine del trattamento 8/12 ore prima dell'ora di carico prevista.

Il dosaggio consigliato è di 15 g/q.le peso vivo una volta al giorno direttamente sulla mangiatoia o nel carro miscelatore.

6 - CAUSE DI NERVOSISMO DI MASSA DURANTE IL CICLO PER CAUSE NON BEN IDENTIFICABILI -

**In questa situazione si consiglia di trattare gli animali
nel seguente modo:**

1[^] giornata: 10 g/q.le peso vivo due volte a distanza di 8/12 ore direttamente nella mangiatoia oppure 20 g/q.le in una sola volta nel carro miscelatore.

2[^] giornata: 10 g/q.le peso vivo una sola volta direttamente sulla mangiatoia o nel carro miscelatore.

3[^] giornata: 5 g/q.le peso vivo una sola volta direttamente sulla mangiatoia o nel carro miscelatore.

4[^], 5[^] e 6[^] giornata: continuare come in 3[^] giornata

In ogni caso prediluire il prodotto con acqua.

7 - PER PREVENIRE LA TENDENZA ALLA “CARNE SCURA“ NELL'ULTIMA SETTIMANA -

In questa situazione si consiglia di trattare gli animali nel seguente modo:

1^giornata 10 g/q.le peso vivo due volte a distanza di 8/12 ore

2^giornata 10 g/q.le peso vivo una sola volta

3^giornata 5 g/q.le peso vivo una sola volta

Sulla mangiatoia o nel carro miscelatore

In ogni caso prediluire il prodotto con acqua



DELTAeur
LA FITOTERAPIA IN ZOOTECCNIA

Delta s.r.l.

Viale Europa, 20 - 35020 Ponte S. Nicolò (PD)

Tel. 049 8962793 - www.deltaeur.com